

# Prurisedán® incoloro

## Difenhidramina - Óxido de Zinc

### Andrómaco

loción

Venta libre  
Industria Argentina

USO EXTERNO

#### **Fórmula:** Cada 100 ml contiene:

Difenhidramina Clorhidrato 1,0000 g; Óxido de Zinc 2,0000 g; Excipientes (Alcanfor 0,6000 g; Glicerina 7,5000 g; Sorbitol 70% 5,0000 g; Hidroxietilcelulosa 0,7770 g; Alcohol Etilico 2,0172 g; Agua Purificada c.s.p. 100,0000 ml).

#### **Acción terapéutica:**

Antipruriginoso, antihistamínico.

#### **Indicaciones:**

La loción es activa, proporcionando alivio frente al prurito producido por quemaduras de sol, picaduras de insectos, reacciones alérgicas a diversas plantas, pelos de animales domésticos y diversas irritaciones de la piel.

#### **Modo de uso:**

**Adultos y niños mayores de 2 años:** Lavar la zona afectada de la piel con agua y jabón. Secar. Aplicar la loción sobre la misma con un suave masaje. Repetir la aplicación 3 ó 4 veces por día, salvo indicación médica.

**Niños menores de 2 años:** Consultar con el médico para su uso.

Agitar antes de usar.

Usar agua y jabón para remover la loción.

Esta medicación no mancha la ropa.

#### **Precauciones y advertencias:**

Evitar la aplicación sobre la piel ampollada o áreas de la misma que estén supurando.

No aplicar sobre extensiones amplias, salvo indicación médica.

No emplear ningún otro medicamento que contenga Difenhidramina mientras dure el tratamiento con este producto.

Evitar el contacto con los ojos y mucosas.

Suspender el tratamiento si se tiene sensación de ardor o en caso de aparecer sarpullido.

Si los síntomas de prurito o picazón persisten luego de un tratamiento de 7 días, consultar con el médico.

PR 105904  
PH 313

**Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.**

#### **Sobredosificación:**

En caso de ingestión accidental comuníquese con los siguientes Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez, Tel. (011) 4962-6666/2247; Hospital A. Posadas, Tel. (011) 4654-6648 ó 4658-7777.

#### **Condiciones de conservación y almacenamiento:**

Conservar a temperatura ambiente menor de 30°C.

"Mantener este y cualquier otro medicamento fuera del alcance de los niños".

Lea atentamente el prospecto.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado N° 43.333.

Director Técnico: Eduardo R. Nasuti, Farmacéutico.

**En Uruguay:** Importado y Distribuido por URUFARMA S.A.

Monte Caseros 3260, Montevideo. Representante N° 312. N° de Reg. 43058.

D.T. Q.F. María del Carmen Cajarville. Tópico dérmico.

Control médico recomendado. Teléfono 0800-PIEL (7435).

**En Paraguay:** Importado por IADELPA S.A.I.C.E.C.A. Tte. Rojas Silva N° 1043 esq. Manuel Ortiz Guerrero, 1er. Piso, Asunción. Aut. por D.N.V.S. del M.S.P. y B.S. Cert. N° 12360-02-EF. Q.F. Marta Chagra de Boesmi, Reg. Prof. N° 2428.

Tel. (595 21) 233 600/1 Fax (595 21) 233 850. E-mail: piel@andromaco.com.py

Ante alguna eventualidad concurrir al Centro Nacional de Toxicología: Teodoro S. Mongelós y Gral. Santos, Asunción. Tel. 204 800, 204 908, 203 113.

Fecha de última actualización del prospecto: 06/03.



**Andrómaco**

Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I.  
Av. Ing. Huergo 1145 - C1107AOL - Bs. As.

Servicio de Atención al Consumidor:

**0810-666-PIEL (7435)**

piel@andromaco.com.ar

www.andromaco.com

**prurisedan.com.ar**